



**Famiglia:** Soricidi

**Genere:** *Crocidura*

**Specie:** *Crocidura russula ichnusae*, Festa 1912

**Nome comune:** Crocidura rossiccia

## Crocidura rossiccia

### IDENTIFICAZIONE

Sottospecie endemica della crocidura rossa europea. A prima vista questo insettivoro può sembrare simile a un topolino di campagna; è invece dello stesso ordine del porcospino (insettivori) e con i roditori ha invece avuto solo una convergenza evolutiva (durante l'evoluzione due specie partendo a volte da antenati molto diversi si evolvono nelle stesse condizioni ambientali sino a sembrare simili).

La testa ha il muso più allungato rispetto al topo e occhi più piccoli. Il corpo misura 5-10 cm e la coda circa 3-5 cm, ricoperta di peli corti e fitti con pochi peli più lunghi con funzione tattile. Pesa 7-15 grammi. La colorazione del corpo va dal grigio al bruno rossiccia sul dorso e grigio giallastro sul ventre. Ha arti corti con 5 dita. Vive circa 2 anni.

Ha un caratteristico odore di muschio dato da un secreto di ghiandole presenti sui fianchi e torace. Per tale motivo la sua pelle veniva usata per profumare i cassetti.

### ALIMENTAZIONE

Ogni giorno deve mangiare cibo per oltre la metà del suo peso.

Si nutre di insetti, lombrichi, lumache e altri invertebrati che riesce a catturare grazie all'olfatto molto sviluppato. Può nutrirsi anche di animali morti.



**COMPORAMENTO**

Più attivo al crepuscolo e la notte, alterna momenti di riposo a momenti di caccia. Costruisce tane scavate nei muri o sotto cumuli di sassi. Vive isolato dai suoi simili che incontra solo nel periodo riproduttivo. Nel periodo molto freddo rallenta la sua attività per risparmiare energia ma non va in letargo.

**RIPRODUZIONE**

Si riproduce in primavera-estate. In questo periodo i maschi producono il caratteristico odore di muschio che serve per delimitare il territorio e da richiamo per le femmine. Ogni anno avvengono 3-4 parti e dopo circa 30 giorni di gestazione nascono da 2 a 6 piccoli, privi di pelo, che vengono allattati per 20 giorni. Dopo questo periodo sono ricoperti di pelo e a 50 giorni sono indipendenti. In caso di pericolo i piccoli possono scappare attaccati alla coda della madre e dei fratelli uniti in catene.

**HABITAT**

Vive nelle radure erbose alternate a macchia, anche in aree coltivate. Predilige i climi caldi.

**STATUS**

Protetta da leggi europee. Può essere predata da uccelli rapaci, carnivori selvatici e domestici. Anche gli incendi possono creare disturbo alla popolazione.

**AREALE DI DISTRIBUZIONE**

Tutta la Sardegna.

