



Famiglia: Lacertidi

Genere: *Podarcis*

Specie: *Podarcis Tiliguerta*, Gmelin 1789

Nome comune: Lucertola tirrenica

Lucertola tirrenica

IDENTIFICAZIONE

Specie endemica sardo corsa. In due piccole isole al largo della Sardegna, la specie tipica in seguito a lungo isolamento si è evoluta in altre due sottospecie. Il corpo è più snello di quello delle altre lucertole e può arrivare a 18-22 cm. La colorazione degli adulti può variare da individuo a individuo e va dal verde al bruno con sfumature più o meno chiare e piccole macchie nere su tutto il dorso. Lungo il dorso sono presenti delle strisce longitudinali più chiare. Sui lati alcune macchie azzurre. Le femmine e i piccoli hanno colori meno brillanti. Le specie presenti nelle isole del Toro e Molaroto hanno la testa completamente nera, il dorso è nero, le parti ventrali sono azzurre con macchie nere. Vive circa 6 anni, in cattività ha raggiunto anche i 10 anni.

ALIMENTAZIONE

Si nutre di insetti, lumache, lombrichi, ragni, piccoli crostacei terrestri; può mangiare anche frutti.



COMPORAMENTO

Ha abitudine diurne, amante degli ambienti caldi, passa parte della giornata distesa al sole per termoregolarsi. Si muove con rapidità, può nuotare e arrampicarsi. È attiva da febbraio per tutta la primavera e l'estate, sino al tardo autunno quando va in letargo per tutto l'inverno.

RIPRODUZIONE

Il periodo riproduttivo va da marzo a maggio; in questo periodo il maschio difende il proprio territorio da altri maschi, con cui può dar luogo a dei combattimenti.

La femmina depone circa 8 uova (4-12) che si schiudono dopo 2-3 mesi a seconda della temperatura.

HABITAT

Si adatta a vivere in quasi tutti gli ambienti; predilige però zone rocciose poste all'interno di radure e macchie. Dal livello del mare sino a 1800 m di altitudine.

STATUS

Specie comune e numerosa, ma protetta da leggi nazionali e internazionali. Le due sottospecie delle isole sono invece rare e potenzialmente minacciate. È predata da serpenti, rapaci e mammiferi carnivori.

AREALE DI DISTRIBUZIONE

La sottospecie tipica vive in tutta la Sardegna, la sottospecie *P. t. ranzii* è esclusiva dell'isola di Molarotto, mentre la sottospecie *P. t. toro* vive solo nell'isola del Toro.

