



Famiglia: Muridi

Genere: Apodemus

Specie: *Apodemus sylvaticus*, Linnaeus

Nome comune: Topo selvatico o di campagna

Topo di campagna

IDENTIFICAZIONE

Sottospecie diffusa in Sardegna e Italia centro-settentrionale.

Roditore un po' più grande del topolino domestico ma con corpo più snello di circa 8-11 cm e coda senza peli di 7-11 cm. Pesa circa 20-22 grammi. Ha occhi e orecchie grandi. Il colore è bruno-rossiccio con sfumature grigie sul dorso, chiaro sul ventre. Abile corridore e nuotatore. Rispetto al topolino domestico è un po' più grande e con orecchie più tondeggianti e occhi più grandi e sporgenti. Inoltre le zampe posteriori sono più lunghe delle anteriori facendogli assumere la tipica andatura saltellante. Vive sino a 3 anni.

ALIMENTAZIONE

Si nutre soprattutto di vegetali, bacche, semi, frutta, bulbi e germogli; può catturare e mangiare anche insetti e lumache. Nei periodi di abbondanza di cibo fa scorta di provviste che vengono nascoste in mucchietti sotterrati in varie dispense; verranno poi ripresi e utilizzate nei periodi di scarsità alimentare.



COMPORAMENTO

Ha abitudini crepuscolari e notturne. A volte è possibile osservarlo anche durante il giorno. È attivo anche in inverno.

Costruisce tane complesse, scavate nel terreno, soprattutto alla base di alberi e cespugli. Le tane sono costituite spesso da varie stanze, utili per le diverse attività (riposo, nido, magazzino) e si aprono all'esterno con diverse uscite. Si possono riconoscere per la presenza di scarti di semi mangiucchiati.

RIPRODUZIONE

Si accoppia in due periodi dell'anno (da febbraio ad aprile e da settembre a dicembre) facendo circa 3-4 parti all'anno. Il nido per i piccoli viene rivestito di muschio e piume di uccelli. Dopo circa 23 giorni di gestazione nascono circa 6 piccoli, nudi e inetti. Questi a 4 mesi sono già maturi e in grado di riprodursi. Per questo motivo e per l'alto numero di parti l'anno in condizioni alimentari ideali possono aumentare facilmente di numero.

HABITAT

Predilige le aree boscate e cespugliate con campi e radure situate ai loro margini in aree dal livello del mare sino alla montagna.

STATUS

Comune e abbastanza numeroso. Non son previste leggi di protezione. Viene predato da rapaci diurni e notturni, mustelidi, gatto selvatico e domestico, colubri.

AREALE DI DISTRIBUZIONE

La specie è distribuita in tutta la Sardegna, l'Italia e buona parte dell'Europa, Nord Africa e paesi del mediterraneo orientale con diverse sottospecie per le diverse aree.

